DERMASTIR® ACIDE KOJIQUE A



DERMASTIR
ACIDE KOJIQUE A

LABORATOIRES ALTA CARE

121, Aven. des Champs-Élysées,
75008 Paris FRANCE

Distribué par:
ALTA CARE Laboratoires
Piazza di Spagna, 6 - 00187 Roma ITALY

Tel. +39 (0)6 6938 0852 +39 (0)6 6050 7487
Email: alta@altacare.com

www.altacare.com

DERMASTIR ACIDE KOJIQUE

L'acide kojique (5-hydroxy - 2 - (hydroxyméthyl) -4 - pyrone) est utilisé dans des formulations de soins de la peau pour éclaircir la peau, comme un autre agent, l'hydroquinone. Cependant, alors que l'hydroquinone agit en inhibant l'activité de la tyrosinase, en agissant tel un inhibiteur de mélanocytes et en augmentant la cytotoxicité des mélanocytes (cellules de mélanine production), l'acide kojique éclaircit la peau uniquement par l'activité de suppression de la tyrosinase (par l'inhibition de l'activité de catecholase de la tyrosinase) d'une manière non traditionnelle. L'acide kojique est connu dans le monde entier pour ses capacités d' éclaircir la peau, et est couramment utilisé dans des formulations topiques pour traiter les taches sombres.

L'acide kojique est un sous-produit du processus de fermentation du maltage du riz dans la fabrication du saké, le vin de riz Japonais. Il y a certainement des recherches convaincantes, à la fois in vitro et in vivo, et également dans les études animales, elles montrent que l'acide kojique est efficace pour inhiber la production de mélanine.

L'acide glycolique avec de l'acide kojique, de même que l'acide glycolique avec de l'hydroquinone sont très efficaces pour réduire la pigmentation chez les patients souffrants de mélasma.

Pourquoi il n'y a pas plus de produits disponibles contenant de l'acide kojique?
L'acide kojique est un ingrédient extrêmement instable en formulation cosmétique. Lors de l'exposition à l'air ou la lumière du soleil, il se tourne vers une étrange nuance de brun et perd de son efficacité. De nombreuses entreprises cosmétiques utilisent le Kojic dipalmitate comme alternative car il est beaucoup plus stable en formulation. Cependant, il n'y a pas de recherche qui montre le kojic dipalmitate est aussi efficace que l'acide kojique, mais il est un bon antioxydant. La recherche montre que l'acide kojique est mieux présenté et stocké dans des ampoules de verre.



INDICATION	ACIDE KOJIQUE BLANCHISSANT	HYDROQUINONE BLANCHISSANT
MÉLASMA	TRÈS BON	EXCELLENT
HYPERPIGMENTATION	TRÈS BON	EXCELLENT
MÉLASMA combiné avec 10% d'acide GLYCOLIQUE	EXCELLENT	EXCELLENT
HYPERPIGMENTATION combiné avec 10% d'acide GLYCOLIQUE	EXCELLENT	EXCELLENT
STABILITÉ DE LA MATIÈRE PREMIÈRE	INSTABLE	EXTRÊMEMENT INSTABLE
STABILITÉ DANS DES AMPOULES DE VERRE	TRES STABLE	PAS DISPONIBLE car elle est trop épaisse
RISQUE DE CANCER	NON	POSSIBLE
PAYS INTERDITS	NON	FRANCE

Depuis que le mode d'action sur la tyrosinase est distinct ils sont donc efficaces en combinaison.

L'acide Kojique oeuvre par éclaircissement de la peau uniquement par l'activité de suppression de la tyrosinase (par l'inhibition de l'activité de la tyrosinase catecholase)

L'hydroquinone agit en inhibant l'activité de la tyrosinase, en agissant tel un inhibiteur de mélanocytes et en augmentant la cytotoxicité des mélanocytes (cellules productrices de mélanine)

L'AMÉLIORATION DU TEINT AVEC L'ACIDE KOJIQUE DERMASTIR



MODE D'EMPLOI

Briser le haut de l'ampoule. Répartir le sérum directement sur la peau ou le mélanger à une crème ou à un masque. Massez délicatement sur les zones concernées jusqu'à complète absorption.

PROGRAMME NORMAL

Phase 1: Appliquer une ampoule tous les trois jours pendant un mois.
Phase 2: Pour consolider les résultats, répéter la phase 1.

PROGRAMME INTENSIF

Phase 1: Appliquer une ampoule de soins de la peau tous les deux jours pendant un mois.
Phase 2: Pour consolider les résultats, répéter la phase 1.

AVERTISSEMENTS

Ne vous exposez pas au soleil. Eviter tout contact avec les yeux et, dans le cas, rincer les yeux avec de l'eau. La pointe de l'ampoule doit être rompue à l'aide d'un morceau de tissu.